

Medicamento para contrarrestar la sobredosis de opioides

Aerosol nasal que revierte una posible sobredosis de opioides



AED

Desfibrilador externo automático (AED por sus siglas en inglés), utilizado para reanimar a personas que sufren un paro cardíaco. Actualmente, hay 3.2 millones de AED ubicados en lugares públicos.

iAmbos salvan vidas!

META:

Contribuir a mejorar el acceso a medicamentos que revierten la sobredosis por opioides, especialmente en zonas rurales. Este medicamento no solo salva vidas, sino que también fortalece la seguridad y el bienestar de las comunidades.

Cinco consejos para el uso responsable de fármacos en caso de sobredosis por opioides:

- Ante una sobredosis de opioides, marque al número de emergencia 911 antes de administrar el medicamento de reversión.
- Administre otra dosis del medicamento cada dos a tres minutos si la persona continúa sin responder.
- La persona que recibió el medicamento para contrarrestar la sobredosis debe permanecer bajo observación hasta que llegue el equipo de atención médica.
- El medicamento para contrarrestar la sobredosis de opioides no reemplaza la atención médica de emergencia. Su duración de acción en el cuerpo es de 30 a 90 minutos.

Para más información visite la página psrota-r.org



ACCEDA A TRATAMIENTOS PARA REVERTIR LA SOBREDOSIS DE OPIOIDES CERCA DE USTED



¿CUÁL ES EL MEDICAMENTO QUE SE UTILIZA PARA REVERTIR UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES?



